



L'AIGUILLE PERCÉE • FICHE DE SOINS  
• PIERCINGS CORPORELS •  
(NOMBRIIL, ARCADE, SURFACE, CARTILAGE, ETC)

LES SOINS À APPORTER APRÈS LA RÉALISATION D'UN PIERCING SONT ESSENTIELS

BEAUCOUP DE COMPLICATIONS INFECTIEUSES PEUVENT ÊTRE ÉVITÉES SI CES SOINS SONT CORRECTEMENT EFFECTUÉS  
UNE BONNE HYGIÈNE NE POURRA QUE FAVORISER LA CICATRISATION

•

RÈGLES À RESPECTER

NE PAS TOUCHER LA PLAIE AVEC LES MAINS NON LAVÉES  
NE JAMAIS ENLEVER LE BIJOU POUR FAIRE LES SOINS  
NE PAS ARRACHER LES DÉPÔTS DE LYMPHE  
À ÉVITER PENDANT QUINZE JOURS : PISCINES, BAINS, SAUNAS ET SOLARIUMS

•

SOINS PRÉCONISÉS : SPRAY ANTISEPTIQUE À BASE DE CHLORHEXIDINE.  
À UTILISER DEUX FOIS PAR JOUR PENDANT DIX JOURS :

PULVÉRISER LE PRODUIT, FAITES GLISSER VOTRE BIJOU ET TAMPONNEZ À L'AIDE DE COMPRESSES STÉRILES.  
À NOTER QUE POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE DE LA CHLORHEXIDINE, IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE NETTOYER LA PLAIE AVANT LA  
DÉSINFECTION. ÉLIMINEZ TOUTE TRACE ÉVENTUELLE (PETITES CROUTES, SANG ...) AVEC DU SÉRUM PHYSIOLOGIQUE ET DES COMPRESSES STÉRILES.

SOUS LES DOUCHES, UTILISEZ UN SAVON pH NEUTRE & RINCEZ SOIGNEUSEMENT.

•

UN SUINEMENT (SÉCRÉTION DE LYMPHE) PEUT ÊTRE OBSERVÉ DURANT LA PHASE DE CICATRISATION  
PLUS OU MOINS IMPORTANT SELON LES PERSONNES. IL EST CONSEILLÉ DE LE NETTOYER AVEC DU SÉRUM PHYSIOLOGIQUE.  
**IMPORTANT** : UNE UTILISATION PROLONGÉE DU PRODUIT ANTISEPTIQUE PEUT ÊTRE LA CAUSE D'IRRITATIONS OU DE COMPLICATIONS.  
PASSÉ LE DÉLAI DE DIX JOURS : STOP !

**SI VOUS AVEZ N'IMPORTE QUELLE QUESTION, DOUTE OU PROBLÈME, N'HÉSITÉS PAS À NOUS CONTACTER.**