L'AIGUILLE
PERCÉE

Feuille de soins
Implant, Microdermal

Règles à respecter :
- Ne pas toucher la zone avec les mains non lavées.
- Ne pas arracher les dépôts de lymphe.
- A éviter pendant 15 jours : piscines, bains, saunas et solariums.

Soins préconisés : **Spray antiseptique** à base de chlorhexidine, type « Diaseptyl ».
A utiliser 2× par jour pendant 5 jours.
—> Pulvérisez le produit, tamponnez à l'aide de compresses stériles.
A noter que pour une efficacité optimale de la chlorhexidine, il est vivement conseillé de nettoyer la plaie avant la désinfection. Eliminez toutes traces éventuelles (petites croutes, sang, ...) avec du sérum physiologique et des compresses stériles.

Sous les douches, utilisez un savon pH neutre, rincez soigneusement.

Il est recommandé de faire très attention les premiers jours, votre implant est fragile, le temps que celui-ci se « fixe » correctement.
Un suintement (sécrétion de lymphe) peut-être observé durant la phase de cicatrisation, plus ou moins important selon les personnes, il est conseillé de le nettoyer avec du sérum physiologique. IMPORTANT : Une utilisation prolongée du produit antiseptique peut être la cause d'irritation ou de complications, passé le délai de 5 jours : STOP !

Si vous avez n'importe quelle question, doute ou problème, n'hésitez pas à me contacter.