



L'AIGUILLE PERCÉE • FICHE DE SOINS

• IMPLANT SKIN DIVER & MICRODERMAL •

LES SOINS À APPORTER APRÈS LA RÉALISATION D'UN MICRODERMAL OU D'UN SKIN DIVER SONT ESSENTIELS

BEAUCOUP DE COMPLICATIONS INFECTIEUSES PEUVENT ÊTRE ÉVITÉES SI CES SOINS SONT CORRECTEMENT EFFECTUÉS
UNE BONNE HYGIÈNE NE POURRA QUE FAVORISER LA CICATRISATION

•
RÈGLES À RESPECTER

NE PAS TOUCHER LA PLAIE AVEC LES MAINS NON LAVÉES
NE PAS ARRACHER LES DÉPÔTS DE LYMPHE
À ÉVITER PENDANT QUINZE JOURS : PISCINES, BAINS, SAUNAS ET SOLARIUMS

•
SOINS PRÉCONISÉS : SPRAY ANTISEPTIQUE À BASE DE CHLORHEXIDINE.

À UTILISER DEUX FOIS PAR JOUR PENDANT DIX JOURS :

PULVÉRISER LE PRODUIT, FAITES GLISSER VOTRE BIJOU ET TAMPONNEZ À L'AIDE DE COMPRESSES STÉRILES.

À NOTER QUE POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE DE LA CHLORHEXIDINE, IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE NETTOYER LA PLAIE AVANT LA DÉSINFECTION. ÉLIMINEZ TOUTE TRACE ÉVENTUELLE (PETITES CROUTES, SANG ...) AVEC DU SÉRUM PHYSIOLOGIQUE ET DES COMPRESSES STÉRILES.

SOUS LES DOUCHES, UTILISEZ UN SAVON pH NEUTRE & RINCEZ SOIGNEUSEMENT.

•
IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE TRÈS ATTENTION LES PREMIERS JOURS, VOTRE IMPLANT EST FRAGILE

LE TEMPS QUE CELUI-CI SE "FIXE" CORRECTEMENT.

UN SUINEMENT (SÉCRÉTION DE LYMPHE) PEUT ÊTRE OBSERVÉ DURANT LA PHASE DE CICATRISATION

PLUS OU MOINS IMPORTANT SELON LES PERSONNES. IL EST CONSEILLÉ DE LE NETTOYER AVEC DU SÉRUM PHYSIOLOGIQUE.

IMPORTANT : UNE UTILISATION PROLONGÉE DU PRODUIT ANTISEPTIQUE PEUT ÊTRE LA CAUSE D'IRRITATIONS OU DE COMPLICATIONS.
PASSÉ LE DÉLAI DE DIX JOURS : STOP !

SI VOUS AVEZ N'IMPORTE QUELLE QUESTION, DOUTE OU PROBLÈME, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.